

在家进行的早期药物流产

- [适合在家进行早期药物流产（EMAH）的必要条件](#)
- [在家会发生什么情况](#)
- [治疗后](#)
- [确定流产治疗有效](#)
- [若出现以下情形，请联系我们获得指导](#)
- [联系方式](#)

适合在家进行早期药物流产（EMAH）的必要条件

您已选择在家进行早期药物流产（EMAH）。这意味着您可以在家使用第二种药物，而不用来医院。

- 年满 16 岁或以上
- 身体健康，无重大的以往怀孕问题
- 第二个治疗日内一整天都有人在家陪伴着您
- 有电话——如有担忧，有可使用的交通工具让您能够前往诊所/医院
- 可在 30 分钟行程时间内抵达一家有急诊部的医院
- 怀孕 9 周以内

您需在服用第一次药物时前往森迪福德（Sandyford），这里的医生或护士会详细解释您的第二次用药，并为您确定第二次用药的日期和时间。您将会得到第二个治疗日的一包药物以及如何用药的说明。

在第一个和第二个治疗日之间，您可能会有出血的情况。即便出现了这一情况，您仍需使用第二种药物，这一点非常重要——我们需要用这两次治疗来确保流产成功。

在家会发生什么情况

您的出血量将会比正常月经更多，并且有可能包含一些大血块。通常将会在第二次治疗后 2-3 小时内开始出血。您应确保在家备好足够的大号或夜用卫生巾。您应按照自己的需要上厕所，可照常冲厕所和处理卫生巾。

请不要使用卫生棉条或月经杯。

治疗后

最初几天的出血量会比较多，之后便会减少。大多数女性治疗后出血总共持续 7-10 天，但有时出血会持续几周之久。

治疗后您将很快又有生育能力，因此立即开始避孕是至关重要的。如果您选择了避孕药，那么您将有一些在同一天开始服用。如果您选择了皮下埋植避孕或注射避孕针剂，那么这将会在您服用第一种药物时给予。如果您希望使用宫内节育器（或避孕环），我们会安排一次回诊预约并为您提供一个中间时期的临时方案。

确定流产治疗有效

尽管这个治疗非常有效，但是在极小几率下可能会没起作用，而且您可能仍是怀孕的。这种情况发生的几率约为百分之一。为确保治疗已经成功，您需要在治疗后三周做一次怀孕检测。这是一项特殊类型的检测，能够发现孕激素是否仍处于高水平，可指示您仍怀有身孕。

如果检测结果呈阳性，或者您担心自己可能仍是怀孕的，我们则会为您安排一次扫描检查。如果检测结果呈阴性，而且您没有什么担忧，则无需回诊。

如果您不想自己来做这个怀孕检测，可以要求获得一次预约并回到诊所来做检测。

若出现以下情况，请联系我们获得建议

- 如果您出现持续大量出血（在休息状态下一小时内浸湿三块以上卫生巾）
- 如果您在第二次治疗后 24 小时内没有任何出血
- 如果您的出血持续总共不足 4 天
- 如果您的分泌物有异味，出现发热或止疼片无法缓解的腹痛
- 如果一周后您仍“感觉”怀有身孕（乳房胀痛、恶心呕吐、腹部更大）
- 如果您没有按医嘱服用药物
- 如果随后的怀孕检测结果为阳性或无效——若您有任何其他的担忧

联系方式

森迪福德 TOPAR 咨询电话： 0141 211 8629 或 07976713277

周一至周四上午 8: 30 到晚上 7 点 周五上午 8: 30 到下午 4: 30

如果您在上述时间之外需要紧急咨询，请拨打 0141 201 2282，联系伊丽莎白女王大学医院（Queen Elizabeth University Hospital）妇科第 49 号病房。

如果出血量非常大或者疼痛剧烈，使您昏厥或感觉很不舒服，则应前往最近的急诊部。

